

Safe use of Infliximab (Remsima) الإستخدام الآمن لدواء انفليكسيماب (ريمسيما)

ما هي بعض الأشياء التي يلزمني معرفتها أو فعلها أثناء تناولي لهذا العقار؟

What are some things I need to know or do while I take this medication?

Before treatment with Remsima	During treatment with Remsima	During treatment with Remsima	أثناء العلاج باستخدام ريمسيما	أثناء العلاج باستخدام ريمسيما	قبل العلاج باستخدام ريمسيما
<ul style="list-style-type: none"> Tell your doctor if you have an infection even if it is a very minor one. It is very important that you tell your doctor if you have ever had tuberculosis (TB), or if you have been in close contact with someone who has had TB. Your doctor will test you to see if you have TB. Ask your doctor to record the type and date of your last screening(s) for TB on the card. Tell your doctor if you have hepatitis B or if you know or suspect you are a carrier of the hepatitis B virus. 	<ul style="list-style-type: none"> Tell your doctor straight away if you have signs of an infection. Signs include a fever, feeling tired, (persistent) cough, shortness of breath, weight loss, night sweats, diarrhea, wounds, dental problems, burning when urinating or "flu-like" signs. <p>Heart failure</p> <p>Before treatment with Remsima</p> <ul style="list-style-type: none"> Tell your doctor if you have any heart problems such as mild heart failure. 	<ul style="list-style-type: none"> Tell your doctor straight away if you notice signs of a heart problem. Signs include shortness of breath, swelling of the feet or changes in our heartbeat. <p>Pregnancy and vaccinations</p> <ul style="list-style-type: none"> In case you have received Remsima while you were pregnant, it is important that you inform your baby's doctor about it before your baby receives any vaccine. Your baby should not receive a 'live vaccine', such as BCG (used to prevent tuberculosis) within 6 months after birth. 	<ul style="list-style-type: none"> أخبر طبيبك على الفور إذا لاحظت علامات الإصابة بمشكلة في القلب. تشمل العلامات ضيق النفس أو تورم القدم أو تغيرات في ضربات القلب. <p>الحمل واللقاحات</p> <ul style="list-style-type: none"> إذا كنت قد تلقيت ريمسيما أثناء الحمل، فمن المهم إبلاغ طبيبك بذلك قبل أن يتلقى طفلك أي لقاح. يجب ألا يتلقى طفلك أي "لقاح حي" مثل BCG (يستخدم للوقاية من مرض السل) خلال 6 أشهر من بعد الولادة. 	<ul style="list-style-type: none"> أخبر طبيبك على الفور إذا ظهرت عليك علامات الإصابة بعدوى. تشمل العلامات حدوث حمى أو الشعور بالتعب أو السعال (المستمر) أو ضيق النفس أو فقدان الوزن أو التعرق الليلي أو الإسهال أو الجروح أو مشكلات الأسنان أو الشعور بحرقة أثناء التبول أو علامات "تشبه الأنفلونزا". <p>فشل القلب</p> <p>قبل العلاج باستخدام ريمسيما</p> <ul style="list-style-type: none"> أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من أي مشكلات في القلب، مثل فشل القلب البسيط. 	<ul style="list-style-type: none"> أبلغ طبيبك إذا كنت تعاني من عدوى حتى ولو كانت بسيطة للغاية. من المهم للغاية أن تخبر طبيبك إذا ما كنت أصبت في السابق بمرض السل (التدرن)، أو إذا كنت على صلة وثيقة بشخص كان مصاباً بمرض السل (التدرن). سيقوم الطبيب بإجراء اختبار عليك لمعرفة ما إذا كنت مصاباً بمرض السل (التدرن). اطلب من طبيبك تسجيل نوع وتاريخ آخر فحص (فحوص) لك لمرض السل (التدرن) على البطاقة: أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من الالتهاب الكبدي ب أو إذا كنت تعرف أو تشك أنك حامل لفيروس الالتهاب الكبدي ب.

Pharmacy Services Department –Reference: Product Information

This content is for informational purposes and is not intended to be a substitute for the advice of a healthcare professional. It is important that you rely on the advice of a healthcare professional for your specific condition

هذا المحتوى هو لأغراض تثقيفية وهو ليس معد كبديل للنصيحة التي يقدمها الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية. من المهم أن تعتمد على نصيحة طبيبك ومقدم الرعاية الصحية فيما يخص حالتك.