

Safe use of Teriflunomide الإستخدام الآمن لدواء تيريفلونوميديد

يُحظر تناول هذا العقار إذا كنت حاملاً. فالاستخدام أثناء الحمل قد يتسبب في إصابة الجنين بعيوب خلقية أو فقدان الجنين

يجب إجراء حمل اختباري للتأكد من أنك لست حاملاً قبل بدء تناول هذا العقار. تحدثي إلى طبيبك في هذا الأمر قبل بدء تناول هذا العقار

تجنبي استخدام هذا العقار إذا كنت قادرة على الحمل، وإذا كنت لا تستخدمين وسيلة منع حمل فعالة لتجنب حدوث حمل. يجب عليك استخدام وسيلة لمنع الحمل خلال فترة تناول هذا العقار، **ولمدة عامين بعد تاريخ آخر جرعة**. سوف يتعين عليك إجراء اختبارات دم تظهر أن جسدك خال من تيريفلونوميديد قبل أن تتوقفي عن استخدام وسيلة منع حمل. إذا أصبحت حاملاً أثناء استخدام هذا العقار، أو خلال عامين من تاريخ آخر جرعة، فاتصلي بطبيبك على الفور.

إذا كانت زوجتك يمكن أن تحمل، فاستخدم وسائل منع الحمل لمنع زوجتك من الحمل. افعل ذلك خلال فترة العلاج، ولمدة عامين من تاريخ آخر جرعة. اتصل بطبيبك فوراً إذا أصبحت زوجتك حاملاً.

استشر طبيبك إذا كنت تعاني من مشكلات في الكبد. لا يجب استخدام هذا العقار مع الأشخاص المصابين بمشكلات معينة في الكبد. قم بإجراء فحص لوظائف الكبد كما أخبرك طبيبك.

Pharmacy Services Department –Reference: JHAH Health Encyclopedia and Product Information

This content is for informational purposes and is not intended to be a substitute for the advice of a healthcare professional. It is important that you rely on the advice of a healthcare professional for your specific condition

هذا المحتوى هو لأغراض تثقيفية وهو ليس معد كبديل للنصيحة التي يقدمها الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية. من المهم أن تعتمد على نصيحة طبيبك ومقدم الرعاية الصحية فيما يخص حالتك.